

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS



①1 N° de publication :  
(A n'utiliser que pour  
le classement et les  
commandes de reproduction.)

2.140.771

②1 N° d'enregistrement national :  
(A utiliser pour les paiements d'annuités,  
les demandes de copies officielles et toutes  
autres correspondances avec l'I.N.P.I.)

71.20546

# ①5 BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE  
PUBLICATION

②2 Date de dépôt ..... 7 juin 1971, à 16 h 17 mn.  
Date de la décision de délivrance..... 26 décembre 1972.  
Publication de la délivrance..... B.O.P.I. — «Listes» n. 3 du 19-1-1973.

⑤1 Classification internationale (Int. Cl.) C 07 c 149/00.

⑦1 Déposant : ARIES Robert, 69, rue de la Faisanderie, Paris (16).

⑦3 Titulaire : *Idem* ⑦1

⑦4 Mandataire :


⑤4 Préparation des dérivés phénoxyalcanoïques et nouveaux produits en résultant.

⑦2 Invention de : Robert Aries.

③3 ③2 ③1 Priorité conventionnelle :

La présente invention se rapporte à des produits industriels nouveaux constitués par des esters dérivés des acides phénoxy-alcanoïques et des bis(hydroxy-4phénylthio) alcanes.

Les composés visés par l'invention sont définis par la  
5 formule générale I ci-après :




15 Dans cette formule, R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène;

R'' représente un reste méthyle ou éthyle;

R''' représente un reste tertioamyle ou tertibutyle;

R'''' représente un reste alcoyle léger;

20 X représente un reste défini par la formule II suivante :




30 dans laquelle B représente un groupe hydrocarboné divalent contenant un à cinq atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée saturée ou éthylénique.

Les composés de l'invention possèdent des propriétés pharmacodynamiques, hypocholestérolémiantes et hypolipémiantes.

35 L'invention vise aussi les procédés de fabrication des composés définis par la formule générale ci-dessus.

Ces procédés consistent dans l'action de l'halogénure ou de l'anhydride d'un acide de formule générale X-COOH sur un bis(hydroxy-4 phénylthio) alcane de formule générale III suivante :



10 dans laquelle R', R'', R''' et R'''' sont tels qu'ils ont été précisés précédemment.

La réaction est effectuée, de préférence, dans un liquide inerte servant de solvant ou support, comme par exemple, un hydrocarbure, un éther-oxyde, un hétérocycle oxygéné, un N,N-  
 15 dialcoylamide ou leurs mélanges; on opère, de préférence, à une température supérieure à celle de l'ambiante comme, par exemple, celle du reflux du solvant ou support utilisé.

On opère, de préférence, en présence d'une base destinée à fixer l'acide halohydrique déplacé dans la réaction, la dite  
 20 base pouvant être, par exemple, un hydroxyde ou un carbonate alcalin, une amine tertiaire ou un hétérocycle azoté tertiaire, ces derniers pouvant servir en partie ou en totalité de solvant des réactifs en présence.

On peut aussi utiliser un dérivé O-métallique préalablement  
 25 isolé du bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane.

#### EXEMPLE 1

Bis [ [ (tétralinyll-4 phénoxy 7-2 méthyl-2 propionoxy 7-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio 7-2,2 propane.

268 grammes (0,5 mole) de bis(ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4  
 30 phénylthio)-2,2 propane et 54 grammes (1 mole) de méthoxyde de sodium sont introduits dans 5 litres de benzène sec; on distille un litre de benzène pour éliminer le méthanol déplacé puis on ajoute peu à peu 253 grammes (1 mole) de chlorure de [ (tétralinyll-1)-4 phénoxy 7-2 méthyl-2 propionyle; on agite pendant 30  
 35 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on maintient pendant 30 minutes; on filtre, sans refroidir, pour éliminer le chlorure de sodium, puis évapore le benzène sous pression réduite; on lave avec un peu de pentane et sèche sous vide.

#### EXEMPLE 2

40 En remplaçant le bis(ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)

-2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane, conforme à la formule III, dans la réaction de l'exemple 1, on peut, notamment obtenir les composés suivants :

- 5 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 éthane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
10 ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 butane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-2,2 hexane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
ditertioamyl-3,5 phénylthio-7-2,2 propane  
15 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
méthyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio-7-2,2 propane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
20 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio-7-1,1 éthane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio-7-2,2 pentane

#### EXEMPLE 2

En remplaçant, dans les réactions de l'exemple 1, le  
25 chlorure de  $\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionyle  
par une quantité équimoléculaire d'un autre chlorure d'acide  
dérivé de la formule II, on peut, notamment, obtenir les  
composés suivants :

- Bis  $\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxyacétoxy-7-4 ditertiobutyl-3,5  
30 phénylthio-7-1,1 propane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 propionoxy-7-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 méthyl-2 propionoxy-7-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane  
35 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 éthyl-2 propionoxy-7-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 éthyl-2 butyroxy-7-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio-7-1,1 propane  
Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy-7-2 butyroxy-7-4 ditertiobutyl  
40 -3,5 phénylthio-7-1,1 propane

71 20546

4

2140771

Bis [ [ [ (tétraliny1-1)-4 phénoxy ]-5 valérianoxy ]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio ]-1,1 propane


Bis [ [ [ (tétraliny1-1)-4 phénoxy ]-2 valérianoxy ]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio ]-1,1 propane

Bis [ [ [ (tétraliny1-1)-4 phénoxy ]-2 acryloxy ]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio ]-1,1 propane

REVENDICATIONS

1°. Produits industriels constitués par les composés définis par la formule générale I suivante :

5



dans laquelle R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène;

15 R'' représente un reste méthyle ou éthyle;


R''' représente un reste tertioamyle ou tertibutyle;

R''' représente un reste alcoyle léger;

X représente un reste défini par la formule II suivante

20

(II)



dans laquelle B représente un groupe hydrocarboné divalent contenant un à cinq atomes de carbone en chaîne droite ou ramifiée saturée ou éthylénique.

30 2°. Produit industriel conforme à la première revendication constitué par le Bis [ [ [ (tétraliny1-1)-4 phénoxy ] -2 méthyl-2 propionoxy ] -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ] -2,2 propane.


3°. Produits conformes à la première revendication constitués par les composés suivants :

35 Bis [ [ [ (tétraliny1-1)-4 phénoxy ] -2 méthyl-2 propionoxy ] -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ] -1,1 propane

Bis [ [ [ (tétraliny1-1)-4 phénoxy ] -2 méthyl-2 propionoxy ] -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ] -1,1 éthane

40 Bis [ [ [ (tétraliny1-1)-4 phénoxy ] -2 méthyl-2 propionoxy ] -4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ] -2,2 butane

- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 méthyl-2 propionoxy]-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 hexane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 méthyl-2 propionoxy]-4  
ditertioamyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane
- 5 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 méthyl-2 propionoxy]-4  
méthyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio]-2,2 propane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 méthyl-2 propionoxy]-4  
isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio]-2,2 propane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 méthyl-2 propionoxy]-4  
isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio]-1,1 éthane
- 10 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 méthyl-2 propionoxy]-4  
isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio]-2,2 pentane
- 4°. Produits conformes à la première revendication constitués  
par les composés suivants :
- 15 Bis  $\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxyacétoxy]-4 ditertiobutyl-3,5  
phénylthio]-1,1 propane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 propionoxy]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 méthyl-2 propionoxy]-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- 20 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 éthyl-2 propionoxy]-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 éthyl-2 butyroxy]-4  
ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- 25 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 butyroxy]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-5 valérianoxy]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 valérianoxy]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- 30 Bis  $\square\square\square$ (tétraliny1-1)-4 phénoxy]-2 acryloxy]-4 ditertio-  
butyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane
- 5°. Procédé de fabrication consistant dans l'action d'un halogé-  
nure ou d'un anhydride dérivé d'un acide de formule générale
- 35 X-COOH, X étant comme il est dit dans la première revendication,  
sur un bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane défini par la formule  
générale III suivante :



- 10 dans laquelle R', R'', R''' et R'''' sont comme il est dit dans la première revendication.
- 6°. Procédé conforme à la revendication 5 caractérisé par la présence dans le milieu réactionnel d'une base minérale ou d'une amine tertiaire ou d'un hétérocycle azoté tertiaire.
- 15 7°. Procédé conforme à la revendication 5 caractérisé par l'emploi d'un dérivé O-métallique du bis (hydroxy-4 phénylthio) alcane de formule III.